

Περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που αρνούνται τα εμβόλια γρίπης, COVID-19: CDC

10/11/2023



Ένα άτομο λαμβάνει ένα εμβόλιο κατά της γρίπης στο Σικάγο, Ιλλ., στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. (Scott Olson/Getty Images)

Του [Zachary Stieber](#)



Η εμβολιαστική κάλυψη, είναι επίσης χαμηλότερη μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με νέα δημοσίευση.

Η κάλυψη εμβολιασμού είναι χαμηλότερη μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των νηπιαγωγών, σύμφωνα με δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν στις 9 Νοεμβρίου από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Μόνο, τέσσερις στους πέντε εργαζόμενους, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, έλαβαν ετήσιο εμβόλιο γρίπης την περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα, από τουλάχιστον 88 τοις εκατό, πριν από την πανδημία.

Τα νοσοκομεία, ανέφεραν εμβολιαστική κάλυψη, μεταξύ των εργαζομένων στο Εθνικό Δίκτυο Ασφάλειας Υγείας του CDC. Στη συνέχεια, οι ερευνητές του CDC, συνέκριναν τα ποσοστά εμβολιασμού, σε όλες τις εποχές της γρίπης ξεκινώντας από το 2017.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κάλυψη, δεν ήταν χαμηλότερη από 88 τοις εκατό, τα χρόνια πριν από την πανδημία, αλλά μετά την έναρξη της πανδημίας, η κάλυψη, έπεσε στο 80 τοις εκατό.

Στην πιο πρόσφατη σεζόν, 2022–2023, η κάλυψη ήταν 81 τοις εκατό. Η σεζόν ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Οι αναφορές προήλθαν από νοσοκομεία οξείας φροντίδας (acute care hospitals).

Ακόμη λιγότερο προσωπικό στα γηροκομεία, έλαβε εμβόλιο κατά της γρίπης την πιο πρόσφατη σεζόν, ανέφεραν οι ερευνητές σε άλλο έγγραφο. Η κάλυψη μεταξύ αυτών των εργαζομένων, ήταν μόλις 47,1 τοις εκατό.

Τα ετήσια εμβόλια γρίπης, συνιστώνται από το CDC, για σχεδόν όλους τους Αμερικανούς ηλικίας 6 μηνών και άνω.

Οι σύμβουλοι του CDC εξετάζουν το ενδεχόμενο να προτείνουν εμβόλια Μροχ για παιδιά.

Δείτε το παρακάτω Video, πατώντας στην επισυναπτόμενη διαδικτυακή διεύθυνση :

https://www.theepochtimes.com/us/more-health-care-workers-refusing-influenza-covid-19-vaccines-cdc-5526415?ea_src=author_manual&ea_med=related_stories

Το CDC συνιστά επίσης, τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 για τον ίδιο πληθυσμό.

Λίγοι εργαζόμενοι, στον τομέα της υγείας έχουν λάβει νεότερα εμβόλια για τον COVID-19, ανακάλυψαν επίσης ερευνητές.

Μόλις το 23 τοις εκατό του προσωπικού σε οίκους ευγηρίας και μόλις το 17 τοις εκατό των εργαζομένων σε νοσοκομεία οξείας περίθαλψης, είχαν λάβει πρόσφατο εμβόλιο κατά την περίοδο Οκτωβρίου–Μαρτίου.

Το CDC συνέστησε στους ανθρώπους να λάβουν ένα δισθενές εμβόλιο για τον COVID-19 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τα **δισθενή εμβόλια**, τα οποία **δεν λειτουργούσαν καλά**, **αντικαταστάθηκαν** πρόσφατα, από μια άλλη νέα σύνθεση.

Η κάλυψη για τα **εμβόλια κατά του COVID-19**, ήταν πολύ υψηλότερη στο παρελθόν. Τον Απρίλιο του 2022, για παράδειγμα, **οι έρευνες έδειξαν ότι το 87,3 τοις εκατό** των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχαν ολοκληρώσει μια πρωτοβάθμια σειρά και το **67,1 τοις εκατό** είχε λάβει **αναμνηστικό**.

Σε όλους τους Αμερικανούς, η **απορρόφηση των εμβολίων COVID-19** έχει **μειωθεί σημαντικά** από νωρίτερα στην πανδημία. Μόλις **το 17 τοις εκατό** έλαβε μια **δισθενή δόση**, σε σύγκριση με το **69,5 τοις εκατό** που ολοκλήρωσε μια αρχική σειρά (1^η δόση), σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Περίπου **το 5 τοις εκατό** των Αμερικανών, έχει λάβει ένα από τα νεότερα **εμβόλια**, τα οποία **εκκαθαρίστηκαν και συστάθηκαν τον Αύγουστο**.

Σε άλλο έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι ερευνητές **διαπίστωσαν** **ότι λιγότερα νηπιαγωγεία έχουν λάβει εμβόλια**, που επιβάλλονται από το σχολείο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.

Η κάλυψη με **εμβόλια** για **ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά (MMR), διφθερίτιδα, τέτανο και κοκκύτη (DTaP), πολιομυελίτιδα και ανεμοβλογιά**, ήταν **95 τοις εκατό** σε εθνικό επίπεδο, τα σχολικά έτη 2019-2020. Αυτή η κάλυψη **μειώθηκε στο 94 τοις εκατό**, κατά **το πρώτο πλήρες σχολικό έτος μετά την έναρξη της πανδημίας** και **μειώθηκε περαιτέρω, στο 93 τοις εκατό το 2021-2022**.

Η κάλυψη **παρέμεινε μειωμένη** το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το νέο έγγραφο, ενώ έχουν χορηγηθεί περισσότερες εξαιρέσεις.

Μεταξύ του ερωτηθέντος πληθυσμού, το 93,1 τοις εκατό των νηπιαγωγών είχε λάβει το εμβόλιο MMR και το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας, ενώ το 92,9 τοις εκατό, είχε λάβει εμβόλιο κατά της ανεμευλογιάς ή ανεμευλογιάς και το 92,7 τοις εκατό, είχε λάβει το εμβόλιο DTaP.

Τα ποσοστά αυτά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Ωστόσο, το 3 τοις εκατό των παιδιών σε εθνικό επίπεδο έλαβαν εξαίρεση από τις σχολικές εντολές εμβολίων, αύξηση 0,4 τοις εκατό, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Οι εξαιρέσεις από τα εμβόλια αυξήθηκαν σε 41 πολιτείες και μειώθηκαν σε μόλις πέντε. Σε 10 από τις πολιτείες, οι εξαιρέσεις είναι πλέον πάνω από 5 τοις εκατό.

Εξηγήσεις

Οι ερευνητές είπαν, ότι η χαμηλότερη πρόσληψη εμβολίων, μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να προέλθει από τον δισταγμό να λάβουν μαζί εμβόλια κατά της γρίπης και του COVID-19.

Πρόσφατη έρευνα πρότεινε ότι, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων και ένας ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι θα έκανε τις δόσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, αν και το CDC, λέει, ότι είναι ασφαλές να γίνονται ταυτόχρονα.

Μια άλλη, εικαζόμενη αιτία, ήταν η μεγαλύτερη χρήση μάσκας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να οδήγησε στην

αντίληψη ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης δεν ήταν τόσο σημαντικός για την πρόληψη της μόλυνσης, είπαν οι ερευνητές.

Η Δρ Mandy Cohen, διευθύντρια του CDC, είπε στο CBS αυτή την εβδομάδα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν εμβόλια κατά της γρίπης και του COVID-19, πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών,



ώστε «το σώμα σας να μπορεί να ενισχύσει την προστασία του πριν από την περίοδο των γιορτών».

Τα μόνα διαθέσιμα δεδομένα για τον άνθρωπο, για τα εμβόλια COVID-19 έδειξαν ότι, αύξησαν τα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που πιστεύεται ότι προστατεύουν από την ασθένεια, αλλά, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καμία εκτίμηση κλινικής αποτελεσματικότητας.

Στη μελέτη του νηπιαγωγείου, οι ερευνητές είπαν ότι, η κάλυψη κάτω του 95 τοις εκατό «αυξάνει τον κίνδυνο για εστίες ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια». Είπαν, ότι η κάλυψη, θα μπορούσε να αυξηθεί επιτρέποντας στους μαθητές να ξεκινήσουν το σχολείο, ενώ αυτοί βρίσκονται σε ένα «πρόγραμμα κάλυψης», για δόσεις που δεν έχουν λάβει ακόμη.

Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν από το οιονεί περιοδικό του CDC , το οποίο, συχνά δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση από ομοτίμους και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εγγράφων ώστε οι εργασίες να ευθυγραμμίζονται με τα μηνύματα του οργανισμού.

Οι αναγνωρισμένοι περιορισμοί, περιλαμβάνουν πιθανές υπερ- ή υποεκτιμήσεις, λόγω ανακριβούς ή απουσίας τεκμηρίωσης.

Η Δρ Dr. Renata Moon, παιδίατρος που [απολύθηκε](#) από μια από τις δουλειές της, **επειδή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τα εμβόλια κατά του COVID-19, είπε ότι πολλοί γονείς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην υγειονομική περίθαλψη.**



«Τα γεγονότα από το 2020 και μετά, **οδήγησαν στην προσέγγισή τους προς «ασφαλέστερη αναμονή»**, σχετικά με τον εμβολιασμό. Οι Αμερικανοί **δεν εκτιμούν** τις προσπάθειες να τους αναγκάζουν να λάβουν προσωπικές αποφάσεις για τα δικά τους παιδιά», είπε η Δ Dr. Renata Moon στους The Epoch Times, μέσω email, μετά την ανασκόπηση των νέων μελετών. .

https://www.theepochtimes.com/us/more-health-care-workers-refusing-influenza-covid-19-vaccines-cdc-5526415?ea_src=author_manual&ea_med=related_stories

Επιλογή, μετάφραση, διαμόρφωση, σχόλια, ανάρτηση-προώθηση, Δρ. Γεωργίου Γεωργαδάκη, χειρουργού-γυναικολόγου-μαιευτήρα (ggeorgad@gmail.com), facebook.com/profile.php?id=100091590918172 Βόλος.

